



# Checklist

Alternatieven besproken & Informed consent verkregen

Folder overhandigd

Screening volledig & adequaat (PSA-formulier, LO, WA, MP, LE)

Materiaal gecontroleerd (SOAPME & luchtwegkar gehaald, 'adverse events' kaart paraat)

Preoxygenatie, monitoring compleet

Iedereen gereed voor de procedure, anesthesie geïnformeerd zo nodig

Bijzonderheden

Stilte, piepers/telefoons afgegeven

Bevestiging juiste patiënt, procedure en kant, meest waarschijnlijke AE's besproken

Afronden Time-out, start PSA

## WA<sub>3</sub>MP<sub>3</sub>LE

**W** Weight

**A** Allergies

**A** ASA

**A** Age

**M** Medication

**P** Past medical history

**P** Previous sedations

**P** Prior intubations

**L** Last meal

**E** Event

## OBESE score

*Voor volwassenen*

**O** Obese (BMI > 26)

**B** Bearded

**E** Elderly (leeftijd >55)

**S** Snore

**E** Edentulous (= geen tanden)

*Voor kinderen*

**N** Neck immobility

**A** Anatomy (afwijking hoofd/hals)

**T** Tongue (= relatief grote tong)

**O** Obese

## Stap 1. Screening

## Stap 2. Voorbereiding

### SOAPME

- S Suction** Apart van afzuigapparatuur nodig voor procedure
- O Oxygen** Non-rebreathing masker met 12 L O<sub>2</sub> pre-oxygenatie.
- A Airway** Beademingsballon aangesloten met goed passend masker. Mayo-tubes, larynxmaskers, laryngoscoop met blad, endotracheale tubes, voerder, cuffspuit.
- P Pharmacy** Medicatie voor procedure en rescue medicatie. Bereken alvast de doseringen. Goed lopend infuus.
- M Monitor** Pols, bloeddruk à 5 minuten, saturatie, capnografie, ECG. Zet geluid van de saturatiemeting aan.
- E Equipment** Materiaal nodig voor de procedure.



**Esketamine\***

Esketamine 0,5-1,0 mg/kg i.v. voor dissociatie  
Esketamine 0,05-0,15 mg/kg i.v. analgesie

**Etomidate**

Etomidate 0,1-0,2 mg/kg (volwassenen)

**Propofol**

Propofol 0,5-1,0 mg/kg i.v. (volwassenen)  
Propofol 1-3 mg/kg i.v. (kinderen)

**Midazolam\***

Midazolam 0,05-0,1 mg/kg i.v.  
Midazolam 0,25-0,5 mg/kg i.n. (0,2 mg/kg, max. 10 mg)

**Fentanyl\***

Fentanyl 0,25-1,0 mcg/kg i.v.  
Fentanyl 1,5 mcg/kg i.n. (2 mcg/kg, max. 100 mcg)

**Naloxone**

Naloxon (Narcan) 0,1-0,4 mg i.v. (volwassenen)  
Naloxon (Narcan) 0,005-0,01 mg/kg i.v. (kinderen)

**Flumazenil**

Flumazenil 0,1-0,5 mg i.v. (volwassenen)  
Flumazenil 0,01 mg/kg i.v. (kinderen)

\*Dosering voor volwassenen en kinderen is gelijk!

## Adverse events

### Bradypnoe, apnoe, hypoxie

- Stimulus
- Manueel luchtweg openen, airway adjuncts
- Maskerbalon

### Hypotensie

- Stimulus
- Vochtbolus: NaCl 250 ml i.v. (kinderen 10-20 ml/kg)
- Vasopressie: efedrine 5mg i.v. (kinderen 0,1-0,3 mg/kg)

### Bradycardie mét hypotensie

- Controle bloeddruk
- Stimulus
- Atropine 0,5 mg i.v. (kinderen 20 mcg/kg)
- Vochtbolus: NaCl 250 ml i.v. (kinderen 10-20 ml/kg)

### Paradoxe reactie

- Stop procedure
- Anexate / flumazenil
- Alternatief: dieper sederen met niet-benzodiazepine

### Braken

- Zijligging
- Suction
- Beschermende positie (Trendelenburg, óf juist rechtop)

### Laryngospasme

- Stop stimulus
- Pressure point en jaw-thrust
- Positieve druk beademing
- Dieper sederen

### Allergische reactie

- Stop agens
- Antihistaminicum: tavegil 2 mg i.v. (kinderen 25-50 mcg/kg)
- Vochtbolus: NaCl 250 ml i.v. (kinderen 10-20 ml/kg)
- Adrenaline 0,5 mg i.m. (kinderen 0,01 mg/kg i.m.)

