

PSA - MEDICATIE	DOSERING <b>IV</b> of <b>IN</b> of <b>IM</b>
Esketamine / Ketanest-S	Analgesie 0,05-0,15 mg/kg <b>IV</b> Dissociatie 0,5-1,0 mg/kg <b>IV</b> Bij hogere doseringen voorkomen <b>hypersalivatie</b> : atropine 0,01mg/kg <b>IV</b> (min 0,1mg, max 0,5mg) Als <b>agitatie bij ontwaken</b> optreed: midazolam 0,03 mg/kg <b>IV</b>
Etomidate	Volwassenen: 0,10-0,3 mg/kg <b>IV</b>
Propofol	0,5-1,0 mg/kg <b>IV</b> <b>Kinderen</b> 1-3mg/kg <b>IV</b> Bij ouderen eventueel lager doseren
Midazolam (Dormicum)*	0,05-0,1 mg/kg <b>IV</b> <b>IN</b> 0,25-0,5 mg/kg (van de 5mg/ml oplossing) - 5 min van tevoren lidocaïne 2% 0,2 ml in neusgat toedienen
Fentanyl*	Titrezen op effect: 1 mcg/kg <b>IV</b> zn à 2-3 min herhalen In combinatie met anestheticum lagere dosering: 0,25 mcg/kg <b>IV</b> <b>IN</b> 1,5 mcg/kg, tweede gift 0,5 mcg/kg
Naloxone (Narcan)*	Volwassenen = 0,1-0,4 mg <b>IV</b> <b>Kinderen:</b> 0,005-0,01 mg/kg <b>IV</b> of <b>IM</b> (max 0,1mg/kg/gift), evt hh na 3 min <b>IN</b> 2mg (van de 1 mg/ml oplossing)
Flumazenil (Anexate)*	Volwassenen = titrezen obv de ademhaling 0,1-0,5 mg, na 1 minuut 0,1 mg <b>IV</b> óf 0,2 mg in 15 sec <b>IV</b> <b>Kinderen:</b> 0,01 mg/kg <b>IV</b> (max 0,2 mg/gift), evt hh na 1 min. Max 0,05 mg/kg/dg. <b>IN</b> 0,04 mg/kg/dosis = 40 mcg/kg/dosis

\*Intranasale toediening mogelijk bij kinderen. Zorg dat de 'dode' ruimte in de MAD gevuld is met de medicatie die je geven wilt, en vul de spuit met de juiste dosering die je geven wilt; gebruik iets meer medicatie dan berekend zodat je de 'tip' van de spuit en de MAD kunt 'aftoppen'.