

Registratieformulier Procedurele Sedatie & Analgesie versie 2.0 NVSHA

arts & procedure	
datum:	ingreep / Indicatie:
sederend arts:	functie: <input type="checkbox"/> ANIOS <input type="checkbox"/> AIOS <input type="checkbox"/> Staf
gesuperviseerd door:	functie: <input type="checkbox"/> AIOS <input type="checkbox"/> Staf
indien PSA niet uitgevoerd ondanks indicatie, reden:	

patiënt	geinformeerd en akkoord: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	PSA folder gegeven: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee	
patiënt nr:	DMV score:	gewicht (kg):	lengte(cm):
geboorte datum:	M / V	relevante VG	
allergieën		medicatie	
ASA klasse*	I II III IV V	helder vloeibaar om .. : .. uur	vast voedsel om .. : .. uur

medicatie	farmacon	route	dosering	
sedativum			1e dosis.....mg	totaal.....mg
analgeticum			totaal..... mg / µg	
co-medicatie			totaal..... mg / µg	
standaard O2 toediening	<input type="checkbox"/> geen <input type="checkbox"/> neusbril 2- 4L <input type="checkbox"/> NRM 15L <input type="checkbox"/> anders:			

bewaking & outcome							events	→	interventie
starttijd = : (=tijd toediening sedativum = 0)							<input type="checkbox"/> agitatie		
diepste sedatie score*:		<input type="checkbox"/> licht <input type="checkbox"/> matig <input type="checkbox"/> diep <input type="checkbox"/> totaal <input type="checkbox"/> NIET					<input type="checkbox"/> apneu >20s		
ketamine sedatie score:		<input type="checkbox"/> niet-gedissocieerd <input type="checkbox"/> gedissocieerd					<input type="checkbox"/> aspiratie		
tijd	-5	0	5	10	15 evt.	20 evt.	<input type="checkbox"/> braken		
AFreq							<input type="checkbox"/> luchtwegobstructie		
sat%							<input type="checkbox"/> sat < 90% >60s		
NIBD							<input type="checkbox"/> syst < 90 mmHg		
pols							<input type="checkbox"/> opname tgv PSA		
(ETCO ₂)							<input type="checkbox"/> overlijden tgv PSA		
eindtijd* = :							<input type="checkbox"/> complicatie*		
ingreep geslaagd:		amnesie:		pijnscore NRS		pijnscore kind 3-8jr			
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee*		(0-10):		(schaal 0-5)*:			
bijzonderheden (beschrijf altijd de interventies n.a.v. een event, is er sprake van een complicatie?)									

* eindtijd = tijd tot patiënt weer helder is, amnesie 'nee' dan Pijnscore invullen.

ASA classificatie


I	gezonde patiënt
II	milde systemische ziekte (bijv goed gereguleerde hypertensie, DM)
III	ernstige systemische ziekte (bijv. ernstige diabetes mellitus met vaatcomplicaties, invaliderende longziekte)
IV	instabiel (bijv ernstig hartfalen, eind stadium nierfalen)
V	mordibund

Sedatiediepte

Minimaal	anxiolyse, bewustzijn is niet verminderd, reageert normaal op aanspreken.
matig	verminderd bewustzijn, patiënt reageert adequaat* op verbale of lichte aanraking
diep	verminderd bewustzijn, patiënt alleen wekbaar na herhaalde of pijnvolle stimulatie, maar reageert adequaat*
totale anesthesie	niet wekbaar


* terugtrekreacties worden niet als adequaat beschouwd

Baker-Wong happy faces



Difficult Mask Ventilation score

- | | |
|---------------------|---|
| Baard | 1 |
| BMI > 26 | 1 |
| Geen tanden | 1 |
| Leeftijd > 55 | 1 |
| Snurken in anamnese | 1 |
- laag risico 0-1 punt
 - hoog risico ≥ 2 punten



Definitie complicatie

Een complicatie is een gebeurtenis die ondanks goed medisch handelen toch een slechte uitkomst heeft voor de patiënt. Deze uitkomst kan directe schade aan de gezondheid zijn, dan wel een langere behandelduur dan normaal gesproken verwacht.

Ontslagcriteria

volwassenen	kinderen
helder en georiënteerd of bewustzijn idem pre-sedatieniveau	kan praten (passend bij leeftijd)
kan drinken, niet misselijk, adequate pijnstilling	kan zelfstandig zitten (passend bij leeftijd)
vitale parameters (ademhaling, circulatie) zijn stabiel	
minimaal 2 uur na het toedienen van antagonist.	