

Patiëntsticker

ARTSEN & PROCEDURE	
Datum:	Indicatie voor PSA:
Sederend arts(en):	Functie(s):
Procedure arts(en):	Functie(s):

SCREENING / WAMPLE					
Weight	Allergies: ASA <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Age:	Medicatie:	Past medical history: Previous sedations:	Last meal: ... Nuchter: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Event:
Harttonen: <input type="checkbox"/> gb <input type="checkbox"/> afwijkend:...			Longgeluiden: <input type="checkbox"/> gb <input type="checkbox"/> afwijkend:...		

OBESE (voorspellers moeilijke masker-ballon beademing)				
<input type="checkbox"/> Obese (BMI>26)	<input type="checkbox"/> Beard	<input type="checkbox"/> Elderly (lft>55jr)	<input type="checkbox"/> Snores	<input type="checkbox"/> Edentulous

LEMON (voorspellers moeilijke intubatie)				
Look externally	Evaluate 3-3-2	Mallampati	Obstruction	Neck mobility
<input type="checkbox"/> normaal <input type="checkbox"/> afwijkingen	<input type="checkbox"/> normaal <input type="checkbox"/> afwijkingen	<input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> normaal <input type="checkbox"/> afwijkingen	<input type="checkbox"/> normaal <input type="checkbox"/> afwijkingen

Informed consent: ja nee

SOAPME					
--------	--	--	--	--	--

Suction	Oxygen	Airway	Pharmacy	Monitoring	Equipment
<input type="checkbox"/> zuig slang	<input type="checkbox"/> positionering	<input type="checkbox"/> mayo tube	<input type="checkbox"/> sedativa	<input type="checkbox"/> pulse oximetry	<input type="checkbox"/> gipsmateriaal
<input type="checkbox"/> Yankauer	<input type="checkbox"/> pre-oxygenatie	<input type="checkbox"/> LMA size: ...	<input type="checkbox"/> analgetica	<input type="checkbox"/> toonmodulatie	<input type="checkbox"/> hecht materiaal
<input type="checkbox"/> check werking	<input type="checkbox"/> NR-Mask	<input type="checkbox"/> tube, size: ...	<input type="checkbox"/> rescue medicatie	<input type="checkbox"/> AH-frequentie	<input type="checkbox"/> repositie materiaal
	<input type="checkbox"/> bag valve	<input type="checkbox"/> cuff spuit 20cc	<input type="checkbox"/> lopend infuus	<input type="checkbox"/> capnografie	<input type="checkbox"/> ECV materiaal
		<input type="checkbox"/> laryngoscoop	<input type="checkbox"/> acute-kar paraat	<input type="checkbox"/> NIBD a 3-5 min	<input type="checkbox"/> LP materiaal
		<input type="checkbox"/> batterij		<input type="checkbox"/> 3 leads ECG	<input type="checkbox"/> procedure collega
		<input type="checkbox"/> Magill-tang			<input type="checkbox"/> stilte kaart

Piepers afgegeven

Time-out

Bijzonderheden/Opmerkingen: ...



SEDATIE / PROCEDURE								
Tijd	Medicatie	AF	Sat	ETCO ₂	Pols	NIBD	Sedatie diepte	Event / Interventie

Minimal (Adverse) Event(s)	Moderate (Adverse) Event(s)	Sentinal (Adverse) Event(s)
<input type="checkbox"/> GEEN ADVERSE EVENTS <input type="checkbox"/> recovery agitatie <input type="checkbox"/> braken <input type="checkbox"/> subklinische ademdepressie <input type="checkbox"/> verlengd herstel > 120 min. <input type="checkbox"/> hypersalivatie <input type="checkbox"/> paradoxale respons <input type="checkbox"/> spierrigiditeit	<input type="checkbox"/> desat 75-90% < 60s <input type="checkbox"/> apneu < 60s <input type="checkbox"/> luchtwegobstructie <input type="checkbox"/> allergie (zonder anafylaxie) <input type="checkbox"/> insult <input type="checkbox"/> bradycardie Δ 25% <input type="checkbox"/> tachycardie Δ 25% <input type="checkbox"/> hypotensie Δ 25% <input type="checkbox"/> hypertensie Δ 25% <input type="checkbox"/> sedatie gefaald	<input type="checkbox"/> desat < 75% <input type="checkbox"/> desat < 90% > 60s <input type="checkbox"/> apneu > 60s <input type="checkbox"/> cardiovasc collaps/shock <input type="checkbox"/> hartstilstand <input type="checkbox"/> overig: ...

Expliciet benoemen volgende interventies en/of rescue-medicatie:
 extra sedativa, anti-emetica, antihistaminica, luchtweg manoeuvre, tactiele stimulatie, extra O₂, antisaliva, oro/nasale luchtweg, masker beademing, CPAP, LMA, antagonist, anticonvulsiva, snelle vochtbolus, intubatie, CPR, neuromusculair blok, pressoren/adrenaline, atropine voor bradycardie.

Sedatie geslaagd:	Ingrep geslaagd:	Dissociatie (esketamine):	Pijnscore (0-10):	Outcome na (Adverse) Event(s):
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee, omdat...	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee, omdat...	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t.		<input type="checkbox"/> geen verandering outcome <input type="checkbox"/> ongeplande opname <input type="checkbox"/> escalatie van zorg <input type="checkbox"/> aspiratie syndroom <input type="checkbox"/> permanente neurol. schade <input type="checkbox"/> dood

Complicatie (een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch-specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade)
 Nee
 Ja: ...

ONTSLAG CRITERIA	
<input type="checkbox"/>	De patiënt heeft hetzelfde bewustzijn als vóór de sedatie en beweegt alle extremiteiten spontaan of op verzoek.
<input type="checkbox"/>	Patiënt ademt diep en kan gemakkelijk ophoesten, bloeddruk \leq 20 mm van het normale niveau en saturatie > 92% met kamerlucht.
<input type="checkbox"/>	De patiënt kan drinken, is niet misselijk en heeft adequate pijnstilling.
<input type="checkbox"/>	Ontslag vindt niet eerder plaats dan: - één uur na de laatste intraveneuze gift van sedativa. - twee uur na de eventuele toediening van antagonist.
<input type="checkbox"/>	De patiënt wordt na ontslag begeleid door een volwassene die zo nodig hulp kan inroepen.
<input type="checkbox"/>	Bij ontslag heeft de patiënt of begeleider de PSA-folder, mondelinge instructies mbt autorijden, bedienen zware apparatuur en tekenen contracten.

Bijzonderheden/Opmmerkingen: ...

